



Fjerning av mandlene er en av de vanligste operasjonene som utføres, særlig på barn. Operasjonen kan utføres ved tilbakevendende halsbetennelser i mer enn to år, tilbakevendende ørebetennelser og, hos barn, ved store mandler som fører til besvær.



Kilde: NPR/SSB



### Fjerning av mandler, kjønns- og aldersjusterte rater pr. 100.000 innbyggere pr. boområde, pr. år og gj.snitt 2011-2013



Kilde: NPR/SSB



### Fjerning av mandler, kjønns- og aldersjusterte rater pr. 100.000 innbyggere pr. boområde, fordelt på offentlig og privat behandler, gj.snitt 2011-2013



## Definisjoner

Følgende kodekombinasjoner definerer pasientgruppen:

Hoved- eller bidiagnose (ICD-10) H65.2, H65.3 eller i kategoriblokken J35, i kombinasjon med prosedyrekodene (NCSP) EMB10, EMB12, EMB15, EMB20, EMB30 eller EMB99 for ISF-finansierte sykehus, og de samme diagnosekodene i kombinasjon med takstene K02a, K02b, K02d, K02e, K02f eller K02g for avtalespesialister.

Privat behandler er private sykehus og spesialister som har avtale om behandling med den offentlige spesialisthelsetjenesten.

	2011	2012	2013	Gj.snitt (%)
Offentlig	11 181	11 082	10 720	10 994 (80%)
Privat	2 580	2 204	3 638	2 807 (20%)
<b>Totalt</b>	<b>13 761</b>	<b>13 286</b>	<b>14 358</b>	<b>13 802 (100%)</b>

### Inngrep pr. år og gj.snitt 2011-2013

## Kommentarer

Det utføres i underkant av 14 000 operasjoner for fjerning av mandler årlig i Norge. Samlet er det økning i antall operasjoner i 2013, og økningen har funnet sted hos private behandlere. Operasjonene utføres i varierende grad av private: I Oslo gjøres 49 % privat, i opptaksområdet til Nordlandssykehuset 1 %.

Det er liten variasjon i ratene fra år til år innad i de enkelte boområdene i perioden, men relativt stor variasjon mellom boområdene. Befolkningen i Finnmark får utført operasjon for fjerning av mandler mer enn dobbelt så hyppig som befolkningen i opptaksområdet til St. Olavs hospital.